

Ooglidcorrectie

U bent op consult geweest voor een ooglidcorrectie bij een van de plastisch chirurgen van de Haaglanden Kliniek, Nederlands Centrum Plastisch Chirurgie.


De Haaglanden Kliniek werkt nauw samen met Medisch Centrum Haaglanden.

Voor de behandeling

Een week voor de behandeling krijgt u een brief waarin vermeld staat hoe laat u op de dag van de behandeling verwacht wordt. Tijdens de ingreep krijgt u van ons een operatie jas aan over uw kleding. Zorg wel voor comfortabel zittende kleding. Op de operatie kamer aangekomen zal de chirurg voor de operatie het behandelend gebied met inkt markeren (1). De chirurg kan door middel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken hoeveel huid er weggenomen kan worden. Een ooglidcorrectie vindt plaats onder plaatselijke verdoving, uw oogleden worden geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt dat tijdens de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt.

De behandeling

Voor de behandeling zal de chirurg u verdoven doormiddel van enkele prikjes. Voor de boven oogleden wordt het sneetje grotendeels in de natuurlijke plooi (2) van het bovenooglid gemaakt, zodat bij geopende ogen nagenoeg geen litteken zichtbaar is. Bij een onderooglid correctie komt het litteken net onder de wimperrand te liggen. Ook hier is het litteken later nauwelijks te zien. Nadat bij de boven en/of onder ooglidcorrectie de huid voorzichtig is geopend, wordt eventueel overtollig vet en/of het overtollige spier- en huidweefsel weggenomen (3). Vervolgens wordt de huid met heel fijne hechtingen gesloten (4).



1

2

3

4

1. het markeren van het te opereren gebied
2. verwijderen van het teveel aan huid
3. het verwijderen van het vet overschot
4. sluiten van de wond met een voortlopende hechting

Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.

De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.

Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Na de behandeling

De ingreep duurt een half uur tot drie kwartier. Na de ingreep worden uw ogen ongeveer twintig minuten gekoeld. Als de oogleden er dan rustig uitzien kunt u plaatsnemen in de lounge waar u nog iets te drinken krijgt. Het herstel na een ooglidcorrectie neemt een week tot tien dagen in beslag. U zult na de behandeling merken dat de huid rond de ogen wat strak aanvoelt. Uw ogen kunnen na de operatie gezwollen zijn en eventueel een bloeditstorting vertonen. Na de ingreep krijgt u hechtpleisters op de wondjes, het is belangrijk deze te laten zitten tot de eerste wondcontrole 5 tot zeven dagen na de behandeling.

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeditstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na een ooglidcorrectie kunnen zijn: zwelling, gestoorde wondgenezing, asymmetrie. Na de behandeling kunt u een tijdelijk gevoel van droge ogen en een gevoelstoornis van de oogleden, met name de wimperrand, ervaren.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze complicaties kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Besluit u tot de behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen. U heeft dit tijdens het consult met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Wij adviseren u thuis uw oogleden de dag van de ingreep te koelen met een koele pakking (bijvoorbeeld met een boterhamzakje met spliterwten). De koelelementen nooit direct op de huid leggen. De pijn en zwelling worden zodoende tegengegaan.
- Arnica druppels/tabletten verminderen de kans op bloeditstortingen en zwellingen. Wij raden u twee weken voorafgaand aan de behandeling te starten. Na de ingreep gaat u nog een week door. U slikt de Arnica in combinatie met vit C 1000 mg.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, aangezien dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
- Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons op nemen via telefoonnummer 070-3385444. Wij staan u graag te woord.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*