

Schaamlipcorrectie

U bent op consult geweest voor een schaamlipcorrectie bij een van de plastisch chirurgen van de Haaglanden Kliniek, Nederlands Centrum voor Plastisch Chirurgie.

De Haaglanden Kliniek werkt nauw samen met Medisch Centrum Haaglanden.

Voor de behandeling

Een week voor de behandeling krijgt u een brief waarin vermeld staat hoe laat u op de dag van de behandeling verwacht wordt. Voordat de chirurg u gaat verdoven krijgt u een verdovende crème waarmee u uw schaamlippen kunt insmeren. Tijdens de ingreep krijgt u van ons een operatie jas aan over uw kleding. Zorg wel voor comfortabel zittende kleding. Op de operatie kamer aangekomen zal de chirurg voor de operatie uw schaamlippen met inkt markeren. De chirurg kan doormiddel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken hoeveel van de schaamlippen er weggenomen kan worden. Een schaamlipcorrectie kan plaats vinden onder narcose of onder plaatselijke verdoving, bij plaatselijke verdoving worden uw schaamlippen geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt dat tijdens de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt.

De behandeling

De ingreep duurt ongeveer een uur. De chirurg zal een gedeelte van de schaamlippen wegnemen en opnieuw modeleren. De wondjes worden gehecht met oplosbaar hechtmateriaal.

Na de behandeling

Na de ingreep worden uw schaamlippen ongeveer twintig minuten gekoeld. De eerste dagen na de behandeling kan het operatiegebied wat pijnlijk aanvoelen. Het is daarom verstandig geen strakke broeken te dragen. Tevens is hygiëne erg belangrijk. Veel douchen/afspoelen en droog deppen.

Het herstel na een schaamlipcorrectie neemt een week tot tien dagen in beslag. Doordat er is gewerkt met oplosbare hechtingen, hoeven deze niet te worden verwijderd. U komt ongeveer een week na behandeling terug voor controle. Hiervoor is een afspraak met u gemaakt.

Hoewel het enige tijd kan duren voordat de littekens goed zijn genezen (eindresultaat: enkele maanden; uiteraard verschillend per persoon), heeft een schaamlipcorrectie een blijvend resultaat.

Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.

De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.

Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na een schaamlipcorrectie kunnen zijn: zwelling, gestoorde wondgenezing, asymmetrie. In enkele gevallen keert het gevoel rondom de littekens niet of niet helemaal terug. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Besluit u tot de behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen. U hebt dit met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Wij adviseren u thuis de schaamlippen de dag van de ingreep te koelen met een koele pakking (bijvoorbeeld met een boterhamzakje met spliterwten). De koelelementen nooit direct op de huid leggen. De pijn en zwelling worden zodoende tegengegaan.
- Arnica druppels/tabletten verminderen de kans op bloeduitstortingen en zwellingen. Wij raden u twee weken voorafgaand aan de behandeling te starten. Na de ingreep gaat u nog een week door. U slikt de Arnica in combinatie met vit C 1000 mg.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, aangezien dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
- Na toiletgebruik de wond spoelen met water.
- Wij raden u aan 24 uur voor de ingreep tot 24 na de ingreep geen alcohol te drinken.
- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3385444. Wij staan u graag te woord.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

Plastische chirurgie
Versie 4
Januari 2010 CE
Akkoord door: directeur