

Wenkbrauwlift

U bent op consult geweest voor een wenkbrauwlift bij een van de plastisch chirurgen van de Haaglanden Kliniek, Nederlands Centrum Plastisch Chirurgie.

De Haaglanden Kliniek werkt nauw samen met Medisch Centrum Haaglanden.

Voor de behandeling

Een week voor de behandeling krijgt u een brief waarin vermeld staat hoe laat u op de dag van de behandeling verwacht wordt. Tijdens de ingreep krijgt u van ons een operatie jas aan over uw kleding. Zorg wel voor comfortabel zittende kleding. Op de operatie kamer aangekomen zal de chirurg het te behandelen gebied met inkt markeren. De chirurg kan door middel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken hoeveel huid er weggenomen kan worden. Een wenkbrauwlift vindt plaats onder plaatselijke verdoving, het gebied boven uw wenkbrauwen wordt geïnjecteerd met een verdovingsvloeistof en een oplossing die ervoor zorgt dat tijdens de behandeling nauwelijks bloed vrijkomt.

De behandeling

De operatie duurt ongeveer drie kwartier. Als de verdoving is ingewerkt zal de chirurg het gemarkeerde gebied boven uw wenkbrauwen wegnemen. De bloedvaatjes worden vervolgens dicht gebrand. De wondjes worden gesloten met zeer fijne hechtingen. Op de wondjes komen hechtpleisters.

Na de behandeling

Na de ingreep wordt het behandelde gebied ongeveer twintig minuten gekoeld. Als de wondjes er rustig uitzien kunt u plaatsnemen in de lounge waar u iets te drinken krijgt. Het herstel na een wenkbrauwlift neemt een week tot tien dagen in beslag. U zult na de behandeling merken dat de huid wat strak aanvoelt. Uw voorhoofd kan na de operatie gezwollen zijn en eventueel een bloeditstorting vertonen. Na de ingreep krijgt u hechtpleisters op de wondjes, het is belangrijk deze te laten zitten tot de eerste wondcontrole 7 dagen na de behandeling.

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeditstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na een wenkbrauwlift kunnen zijn: tijdelijke uitval van een zenuw, meestal herstelt de motoriek of het gevoel zich geheel of gedeeltelijk. Rond het litteken zal de huid gevoelloos raken en dit kan geruime tijd zo blijven. In enkele gevallen keert het gevoel rondom de littekens niet of niet helemaal terug.

Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.

De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.

Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Verstoorde wondgenezing en weefselversterf komen zeer zelden voor. Deze verschijnselen kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Een enkele keer veroorzaakt de wenkbrauwlift een opvallend litteken waardoor een nieuwe correctie nodig is. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Besluit u tot de behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen. U heeft dit tijdens het consult met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Na de ingreep raden wij aan uw voorhoofd te koelen met een koele pakking, dit is om de pijn en zwelling te verminderen. U kunt bijvoorbeeld spliterwten in een boterhamzakje en dan in de vriezer leggen. Een koelbril is uiteraard ook een optie. De koelelementen mogen nooit direct op de huid gelegd worden.
- Arnica druppels/tabletten verminderen de kans op bloedingen en zwellingen. Wij raden u twee weken voorafgaand aan de behandeling te starten. Na de ingreep gaat u nog een week door. U slikt de Arnica in combinatie met vit C 1000 mg.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, aangezien dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
- Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken.
- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3385444. Wij staan u graag te woord.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*