

Lipofilling

U komt binnenkort voor een lipofilling bij een van de plastisch chirurgen van de Haaglanden Kliniek, Nederlands Centrum Plastisch Chirurgie.

De Haaglanden Kliniek werkt nauw samen met Medisch Centrum Haaglanden.

Voor de behandeling

Een week voor de operatie krijgt u een brief waarin vermeld staat hoe laat u op de dag van de ingreep verwacht wordt. Tijdens de ingreep krijgt u een operatie jas aan. Zorg wel voor comfortabel zittende kleding. Op de operatie kamer aangekomen zal de chirurg voor de operatie het te behandelen gebied waar de inspuiting plaats zal vinden met inkt aftekenen. De chirurg kan doormiddel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken waar en hoeveel vet er ingespoten dient worden voor. Een lipofilling kan plaats vinden onder plaatselijke verdoving en onder narcose.

De behandeling

De tijdsduur van de behandeling is afhankelijk van de uitgebreidheid van het te behandelen gebied. Op de operatiekamer wordt met dunne buisjes wat vet weggezogen. Dit gebeurt meestal rond de navel. Het vetweefsel wordt vervolgens geïnjecteerd op de gewenste plaats. De behandeling neemt ongeveer een uur in beslag.

Na de ingreep worden de wondjes gehecht. Hierop komen kleine hechtpleistertjes.

Na de behandeling

Na de ingreep kunt u een beurs gevoel hebben, dit verdwijnt vanzelf. Op de wondjes krijgt u kleine hechtpleistertjes, deze kunt u laten zitten tot de eerste wondcontrole na ongeveer 7 dagen, u ontvangt hiervoor een afspraak. Douchen mag u de dag na de ingreep.

Sporten mag u, afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie en de locatie, na 4 tot 6 weken.

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is de kans op complicaties, zoals allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose aanwezig, deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na een lipofilling kunnen zijn: Zwellingen ter hoogte van de inspuiting, gestoorde wondgenezing, beschadiging van een zenuwtakje wat kan resulteren in gevoelloze plekjes, onregelmatig huidoppervlak.

Soms is het nodig de behandeling te herhalen, als een deel van het ingespoten vetweefsel wordt afgebroken.

Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met de arts met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Besluit u tot de behandeling over te gaan, dan volgen hieronder alvast enkele richtlijnen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen. U hebt dit met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, alle andere pijnbestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Arnica druppels/tabletten verminderen de kans op bloedingen en zwellingen. Wij raden u twee weken voorafgaand aan de behandeling te starten. Na de ingreep gaat u nog een week door. U slikt de Arnica in combinatie met vit C 1000 mg.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, aangezien dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.
- Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken.
- U mag de dag na de ingreep kort douchen.
- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact met ons op nemen via telefoonnummer 070-3385444. Wij staan u graag te woord.

*Dit is een uitgave bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren.
De behandelend arts kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van hetgeen hierboven beschreven is.
Aan deze beschrijving kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.*

